

# Naamakukkaiskasvit

□

## Sisällys

- [1 Ukontulikukka](#)
- [2 Tummatulikukka](#)
- [3 Kannusruoho](#)
- [4 Kissankita](#)
- [5 Syyläjuuri](#)
- [6 Vesitädyke](#)
- [7 Tähkätädyke](#)
- [8 Ketotädyke](#)
- [9 Kevättädyke](#)
- [10 Rantatädyke](#)
- [11 Orvontädyke](#)
- [12 Rohtotädyke](#)
- [13 Nurmitädyke](#)
- [14 Ojatädyke](#)
- [15 Maitikat](#)
  - [15.1 Kangasmaitikka](#)
  - [15.2 Metsämaitikka](#)
  - [15.3 Lehtomaitikka](#)
  - [15.4 Tähkämaitikka](#)
  - [15.5 Peltomaitikka](#)
- [16 Silmäruohot](#)
  - [16.1 Ketosilmäruoho](#)
  - [16.2 Tanakkasilmäruoho](#)
  - [16.3 Perämerensilmäruoho](#)
  - [16.4 Punakko](#)
  - [16.5 Peltosänkiö](#)
  - [16.6 Punasänkiö](#)
  - [16.7 Suolasänkiö](#)
- [17 Laukut](#)
  - [17.1 Isolaukku](#)
  - [17.2 Pikkulaukku](#)
  - [17.3 Lapinlaukku](#)
  - [17.4 Kaarlentikkä](#)
  - [17.5 Luhtakuusio](#)
  - [17.6 Lapinkuusio](#)
  - [17.7 Karvakuusio](#)

## Ukontulikukka

Verbascum thapsus. 1. kesänä lehtiruusuke, 2. kukintoverso ja kuolee. Itää vain valossa ja taimet vaativat tilaa. Ei kelpaa karjalle. Kuivuneita varsia kastettiin tervaan ja käytettiin soihtuina -

->kungsljus ja antiikin aikaan candela regia eli kuninkaan kynttilä. Myrkyllinen. Rohdoksena. Kuivatut versot karkottamaan hiiriä ja rottia, siemenien myrkky tainnuttamaan kaloja. Kenties karvaisin kasvimme, suojaa paahteelta, kuivumiselta, tasaa lpt., suojaa kasvinsyöjiltä kuten kirvoilta

### **Tummatulikukka**

V. nigrum. Kuolevan juurakon kylkeen syntyy sivusilmu -->monivuotinen kasvi.

### **Kannusruoho**

Linaria vulgaris. Kaikki sisämaan kasvupaikat ihmisen luomia. Kukka tiukasti kiinni, raskas kimalainen vääntää huulta että saa kielensä kukkaan ja meden syvältä kannuksesta. Myös viisikannuksisia kukkia yhden sijaan -->Linné uskovaisena säikähti tätä ja antoi nimeksi Peloria kreik. pelor, hirviö mukaan. Linné uskoi Jumalan luomiin lajeihin ja sijoitti tämän viisikannuksisen eri luokkaan, eikä halunnut puhuttavan koko kasvista.

### **Kissankita**

Chaenorhinum minus.

### **Syyläjuuri**

Scrophularia nodosa. Tämä ja lehtoneidonvaippa sopeutuneet ampiaisen pölyttäväiksi. Ampiaisen kovapintainen ja ruokkii toukkansa liharuoalla eli huono pölyttäjä yleisesti. Tekee ampiaisen riippuvaiseksi, lihanpunaisin ja ruskein sävyin sekä raadollisin hajuin. Elias Lönnrotin 1. kasvio 1860. Käytetty muinoin rohdoksena.

### **Vesitädyke**

Veronica catenata. Viimeksi tavattu 1857 Lappeenrannassa.

### **Tähkätädyke**

V. spicata. Mainittu jo Tillandzin 1683 ilmestyneessä kasvistossa, joka on ensimmäinen laatuaan.

### **Ketotädyke**

V. arvensis.

### **Kevättädyke**

V. verna.

### **Rantatädyke**

V. longifolia.

### **Orvontädyke**

V. serpyllifolia. Alalaji pohjantädykkeen löysi Laestadius Kaaresuvannosta 1839. Lars Laevi Laestadius nuori kasvitieteilijä hylkäsi kasvitieteen todettuaan sen kunnianhimoista kiihkoa etsittäessä uusia lajeja ja pyrittäessä kasvintutkijain valiojoukkoon.

## **Rohtotädyke**

*V. officinalis*. Leiniruoho, rampariienheinä. Uskottu parantavan. Noitien karkottamiseen Lönnrotin mukaan.

## **Nurmitädyke**

*V. chamaedrys*.

## **Ojatädyke**

*V. beccabunga*. Ilmavaivoihin, keripukkiin, maksasairauksiin, virtsateiden tulehduksiin.

## **Maitikat**

Pidetty lehmiä maidontuotantoa lisäävänä, vain väriä vahvistavana --> ruots. kovall. Siemenissä öljypitoinen lisäke muurahaisille, joka syötyään lisäkkeen hylkää siemenen matkalla keolle.

## **Kangasmaitikka**

*Melampyrum pratense*. 1-vuotinen. Metsämaitikan kanssa kasvattaa alkuun päästyään imujuuren toiseen kasviin ja tämän tapahduttava ensimmäisinä viikkoinaan ettei menehdy. Mm. mänty, puolukka, metsämaitikalla kuusi ja mustikka. Rosvoavat myös toisiltaan ravintoa.

## **Metsämaitikka**

*M. sylvaticum*. 1-vuotinen.

## **Lehtomaitikka**

*M. nemorosum*. Rannikolla svenska flaggan keltaisen ja violetin värien mukaan. Tai natt och dag.

## **Tähkämaitikka**

*M. cristatum*.

## **Peltomaitikka**

*M. arvense*. Rauhoitettu.

## **Silmäruohot**

Määrittäminen vaikeaa. Yksivuotisia. Sirkkataimi kasvattaa imujuuren heti kun mahdollista, muulloin kasvaa hitaasti.

## **Ketosilmäruoho**

*Euphrasia stricta*. Kukka kuin silmä. Silmärohtona käytetty. Myrkyllinen

## **Tanakkasilmäruoho**

*E. nemorosa*.

## **Perämerensilmäruoho**

*E. bottnica*. Kotoperäinen.

## **Punakko**

*Bartsia alpina*. Linné nimesi ystävänsä J. Bartschin muistoksi, joka kuoli 1738 ja punakon ulkoasu kuvaa ystävän menetyksen surua. Valossa punaisin. Vaikuttaa lapinkuusion toukkien määrään, toukkien herkkua.

## **Peltosänkiö**

*Odontites verna*. Nimi ilm. sänkipellosta.

## **Punasänkiö**

*O. vulgaris*.

## **Suolasänkiö**

*O. litoralis*.

## **Laukut**

Puoliloisivat, kuten myös silmäruohot, sänkiöt, punakko, maitikat ja kuusiot. Puoliloisilla on omaa lehtivihreää. Varsinaisia loisia mm. humalanvieras, suomukka, mäntykukka, lehtivihreättömät kämmekät.

## **Isolaukku**

*Rhinanthus serotinus*. Iso kasvusto vähentää isäntäkasvin kukintaa. Varsi tummapilkkuinen.

## **Pikkulaukku**

*R. minor*. Loisii ilmeisesti kaikilla niityn kasveilla, parhaita hernekasvit.

## **Lapinlaukku**

*R. groenlandicus*.

## **Kaarlensvaltikka**

*Pedicularis sceptrum-carolinum*. Hevosensäätäri. Olof Rudbeck nuorempi nimesi kuninkaansa Kaarle XII kunniaksi. *Pediculus* = lat. täi. Kuusiot täin karkotteita. Ruots. *lusgräs* eli täiruoho. Valtikkaa muistuttavat kiehkuramaisesti ryhmittyneet kukat. Hammaskipuun siemenet.

## **Luhtakuusio**

*P. palustris*.

## **Lapinkuusio**

*P. lapponica*. Siemensatoa alentaa lantakärpäsen ja valekääriäisen toukat. Isäntiä mm. vaivaiskoivu, mustikka.

## **Karvakuusio**

P. hirsuta. Isäntä kenties liekovarpio.